ELUDRIL Solución
Prospecto

ANTISÉPTICO BUCOFARÍNGEO
ELUDRIL SOLUCIÓN

Composición

Digluconato de Clorhexidina	0,100 g
Hemihidrato de Clorobutanol	0,100 g
Etanol	
Glicerol (E-422)	
Solución alcohólica de Aceite de menta	
Docusato de Sodio	
Parahidroxibenzoato de Metilo (E-218)	
Parahidroxibenzoato de Propilo (E-216)	
Levomentol	
Rojo cochinilla A (E-124)	
Agua purificada c.s.p.	100 ml

Presentación
Solución. Frasco de 200 ml.

Propiedades
La Clorhexidina es un eficaz antiséptico, especialmente activo frente a numerosos gérmenes patógenos. Gracias a ello y a su especial preparación, ELUDRIL Solución actúa etiológicamente frente a los problemas inflamatorios de origen bacteriano de la boca y la faringe:

- Destruye la placa bacteriana dental y previene su formación.
- Restaura y mantiene la asepsia de las mucosas bucales y faríngeas.

El Clorobutanol, además de propiedades antibacterianas y antifúngicas, tiene un efecto analgésico local, que contribuye al alivio sintomático de las patologías bucofaríngeas.

Indicaciones
- Enfermedades de la zona gingivo-dental:
  Gingivitis, estomatitis, alveolitis, periodontitis.
  Tratamientos pre y post-operatorios de las extracciones dentales.

- Profilaxis e higiene bucodental:
  Preventivo de la caries y el sarro. Como solución dentífrica en los portadores de aparatos ortodóncicos.

- Enfermedades de la zona bucofaríngea:
  Faringitis, amigdalitis.
  Cuidados pre y post-operatorios en ORL.

Contraindicaciones, efectos secundarios y precauciones
Hipersensibilidad a alguno de los componentes.

En el caso de los niños es conveniente asegurarse de que no ingieran el producto.

Tras el uso prolongado puede presentarse coloración de los dientes y de los empastes, que puede evitarse en gran parte cepillando diariamente con una pasta dentífrica convencional antes de usar el preparado.

En algunos casos pueden presentarse alteraciones del gusto que disminuyen con el uso continuado del producto.

Advertencia sobre excipientes:
Las aplicaciones frecuentes pueden producir irritación y sequedad de piel. Este medicamento contiene Rojo cochinilla A como excipiente. Puede causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetil salicílico.

Incompatibilidades
No se conocen.

Modo de empleo
Diluir 10 ó 15 ml en agua tibia, utilizando para ello el vasito dosificador incluido en el producto (ver figuras) y enjuagar o gargarizar, según la zona afectada, durante unos 30 segundos. Repetir la operación hasta agotar la solución preparada. NO INGERIR.

El tratamiento con ELUDRIL Solución se realizará al menos 2 ó 3 veces al día.

Según la severidad del proceso, puede aumentarse la dosis hasta 20 ml. En los niños se aconseja la mitad de la dosis (5 ml).

(Dibujo frasco Eludril vertiendo la solución hasta la 1ª marca (10-15 ml) en el vaso dosificador).	(Dibujo botella vertiendo agua tibia en vaso dosificador hasta la 2ª marca). .
Verter Eludril Solución en el vasito hasta la línea correspondiente.	Completar con agua tibia hasta la línea superior.

Intoxicación y su tratamiento
Debido a su baja absorción, su riesgo de toxicidad es prácticamente nulo. Ante una masiva ingestión del producto pueden presentarse síntomas de irritación intestinal o de intoxicación general con tendencia a depresión circulatoria. Ante estos casos debe acudirse a un centro médico donde se procederá a un lavado gástrico, medidas sintomáticas frente a la irritación intestinal y terapéutica adecuada a los síntomas de depresión circulatoria que se presenten.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

Fecha de caducidad
No debe emplearse el producto después de la fecha de caducidad que figura impresa en el estuche y en la etiqueta del frasco.

Sin receta médica.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

Pierre Fabre
PIERRE FABRE IBÉRICA, S.A.
C/ Ramón Trias Fargas, 7-11
08005 BARCELONA
Fabricado en Francia por Pierre Fabre Médicament Production